

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente  
BRONCHODUAL \* TOSSE E GOLA Pastiglie molli  
Estratto secco di timo, estratto secco di radice di altea

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è BRONCHODUAL TOSSE E GOLA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHODUAL TOSSE E GOLA
3. Come prendere BRONCHODUAL TOSSE E GOLA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare le BRONCHODUAL TOSSE E GOLA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. COS'È BRONCHODUAL TOSSE E GOLA E A COSA SERVE

BRONCHODUAL TOSSE E GOLA contiene il principio attivo estratto secco di timo e radice di altea.

BRONCHODUAL TOSSE E GOLA è un medicinale tradizionale di origine vegetale usato per facilitare l'espettorazione del catarro in caso di tosse associata a raffreddore e per il trattamento sintomatico di irritazione della mucosa orale o faringea e tosse secca associata.

L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale per le indicazioni terapeutiche indicate si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5 giorni.

#### 2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Non prenda BRONCHODUAL TOSSE E GOLA se si è ipersensibile (allergico) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti della famiglia delle Lamiaceae o degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere BRONCHODUAL TOSSE E GOLA.

In caso di respirazione difficile (dispnea), febbre o espettorato purulento, consulti il medico.

##### Altri medicinali e BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Teoricamente l'altea può ritardare l'assorbimento di medicinali assunti in concomitanza: è opportuno non assumere BRONCHODUAL TOSSE E GOLA da mezz'ora a un'ora prima o dopo avere assunto altri medicinali.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

##### Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non sono stati effettuati studi sulla fertilità.

La sicurezza di BRONCHODUAL TOSSE E GOLA durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non è stata stabilita. Il medico le prescriverà BRONCHODUAL TOSSE E GOLA solo in caso di effettiva necessità.

##### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

BRONCHODUAL TOSSE E GOLA contiene sorbitolo

Questo medicinale contiene 210 mg di sorbitolo per pastiglia.

BRONCHODUAL TOSSE E GOLA contiene maltitolo

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

#### 3. COME PRENDERE BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Adulti, adolescenti di età superiore ai 12 anni:

1-2 pastiglie molli ogni 4 ore (da 4 a 6 volte al giorno).

La dose massima giornaliera è di 12 pastiglie molli.

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni:

1 pastiglia molle ogni 3 - 4 ore (da 4 a 6 volte al giorno).

La dose massima giornaliera è di 6 pastiglie molli.

#### Bambini di età inferiore ai 6 anni: \_\_\_

La sicurezza e l'efficacia di BRONCHODUAL TOSSE E GOLA nei bambini di età inferiore ai 6 anni non sono state ancora stabilite.

Modo di somministrazione:

Per uso oromucosale (lasciare sciogliere in bocca).

Durata del trattamento:

Non usi BRONCHODUAL TOSSE E GOLA per più di 5 giorni.

Se non osserva un miglioramento consulti un medico.

Se prende più BRONCHODUAL TOSSE E GOLA di quanto deve

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

Se dimentica di prendere BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Se ha qualsiasi altro dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### 4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, BRONCHODUAL TOSSE E GOLA può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono state osservate reazioni allergiche (ipersensibilità) e disturbi dello stomaco e dell'intestino (gastrointestinali) con l'assunzione di medicinali a base di timo. La frequenza non è nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa)

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### 5. COME CONSERVARE BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### 6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene BRONCHODUAL TOSSE E GOLA

Una pastiglia contiene:

principi attivi:

51,1 mg di estratto (come estratto secco) di *Thymus vulgaris* L. or *Thymus zygis* L. herba (foglia e fiore di Timo) (7-13:1), corrispondente a 357.7-664.3 mg di

Timo. Solvente di estrazione: acqua. L'estratto contiene 1.1-1.5 mg di olio essenziale di Timo.

4,5 mg di estratto (come estratto secco) di *Althaea officinalis* L. (radice di Altea) (7-9:1), corrispondente a 31.5-40.5 mg Altea. Solvente di estrazione: acqua.

Eccipienti:

Acacia (gomma arabica, E 414), sorbitolo liquido (E 420), maltitolo liquido, maltodestrina, acido citrico anidro (E 330), saccarina sodica, aroma di aronia, aroma di frutti di bosco, paraffina liquida chiara, cera d'api bianca, acqua purificata.

Descrizione dell'aspetto di BRONCHODUAL TOSSE E GOLA e contenuto della confezione

BRONCHODUAL TOSSE E GOLA sono pastiglie molli rotonde di colore marrone. BRONCHODUAL TOSSE E GOLA è disponibile in confezioni contenenti blister da 10, 20, 30 o 40 pastiglie molli. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
Kwizda Pharma GmbH  
Effingergasse 21  
1160 Vienna,  
Austria

Produttore  
Kwizda Pharma GmbH  
Effingergasse 21  
1160 Vienna,  
Austria

Concessionario per la vendita  
Perrigo Italia S.r.l.  
Divisione Fitoterapia Bronchenolo  
Viale dell'Arte, 25  
00144 - Roma

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 10/2018